



ビクトーザ<sup>®</sup>を使用される方へ

早いうちから始めよう

# ビクトーザ<sup>®</sup> 療法




監修

横浜市立大学大学院医学研究科  
分子内分泌・糖尿病内科学 教授

寺内 康夫 先生




佐藤さん  
こんにちは



患者  
佐藤 貴子

今日は  
佐藤さんの  
糖尿病治療を  
見直して  
みましょうか



お薬を  
一剤追加して  
みましょう

現在は  
メトホルミンを  
服用されて  
いますが



治療を見直すって  
どのようなことを  
するのですか？



ビクトーザ®は、  
GLP-1  
(ジーエルピーワン)  
受容体作動薬という  
種類のお薬です



佐藤さんの  
現状を考えると  
私はビクトーザ®  
というお薬で  
治療を強化するのが  
良いのではないかと  
思います

食事をして  
糖質を摂ると

小腸から  
GLP-1という  
ホルモンが出ます

このGLP-1は  
すい臓のβ細胞に  
働きかけて  
インスリンを出させ

食事によって  
高くなる血糖値を  
コントロールする  
働きをしています

栄養素


小腸

インスリン

すい臓β細胞

GLP-1受容体

GLP-1






では  
実際に  
薬を見て  
みましょうか



佐藤さんのように  
β細胞機能が  
残っている  
2型糖尿病  
患者さんは  
良い適応だと  
思います

また  
ビクトーザ®は  
低血糖を  
起こさず  
ですしね



え！  
ちゅ、注射  
なんですか!?



でも、  
これ痛いんですか？



はい。  
ご自分で  
注射いただけ  
ますよ

でもたぶん  
思っている程  
痛くはありま  
せんよ

とても細くて  
短い針を  
使いますし  
注射するのは  
脂肪組織の多い  
部位ですから

私も試しに  
刺してみたことが  
ありますが  
痛くなかったですよ

採血用の注射針

ビクターザ®


やっぱり  
注射というと  
痛いと思われる  
んですね

そういえば  
お友達が  
インスリン注射での  
治療を始めたとき  
少しの間  
病院に入院したと  
聞きましたか、


ビクターザ®も  
入院は必要ですか？

そうですねか…

どうして  
ご安心ください




\* 投与量は主治医の指示に従ってください。



# 4ステップで、簡単に使えます


## 1 針を取りつける



## 2 空打ち (試し打ち) をする




## 3 投与量を設定する




## 4 注射する









自宅で  
注射できる時間に  
決めてしまえば  
人前で注射をする  
必要はありませんよ



ビクトーザ®は  
1日1回、  
朝、または  
夕方に  
時間を決めて  
注射をすれば  
いい薬なのです






それなら  
仕事や外出、  
お友達との付き合いも  
今までと変わりなく  
続けられますね



はい

今日から  
早速使って  
みましょうかね  
後ほど  
スタッフが  
使い方をご説明  
します





ビクトーザ®は、SU(スルホニル尿素)薬やインスリンなど他の糖尿病薬と一緒に使う場合には低血糖が起こる可能性が高くなります

ふるえ、冷や汗、どうき、空腹感などの低血糖症状があらわれたら、すぐに主治医に報告してください

### 主な低血糖症状



ふるえ



冷や汗



どうき



空腹感

# 血糖値・体重チェックリスト

		1日目 ( 曜日)	2日目 ( 曜日)	3日目 ( 曜日)	4日目 ( 曜日)	5日目 ( 曜日)	6日目 ( 曜日)	7日目 ( 曜日)
1週	血糖値	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL
	体 重	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
2週	血糖値	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL
	体 重	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
3週	血糖値	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL
	体 重	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
4週	血糖値	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL
	体 重	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
5週	血糖値	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL	mg/dL
	体 重	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg

●血糖値・体重は、毎日一定の時刻に測定してください

## ノボケア相談室

製品に関する疑問・質問などは、お気軽に下記のノボケア相談室にお問い合わせください。



**月曜日から金曜日**

(祝日・会社休日を除く)

 **0120-180363**



**夜間及び  
土日・祝日・会社休日**

(注)お問い合わせ内容によっては、翌営業日に回答させていただきます。

 **0120-359516**